

Énoncé

Dr Sidibé, est le médecin-chef du service de diabétologie de l'hôpital national Donka en Guinée. En 2016, il a constaté au cours du suivi de routine de ses patients, une fréquence élevée des cas de diabétique de type 2.

Sur la base de son expérience de diabétologue, il est informé qu'environ 80% des cas de diabète de type 2 seraient associés à une surcharge pondérale et qu'une alimentation bien équilibrée représente la première mesure de prévention des maladies cardiovasculaires en plus du diabète. Aussi, il sait que les mesures hygiéno-diététiques constituent la base du succès d'une prise en charge efficace du diabète de type 2.

Ainsi, disposant de toutes ces informations, le Dr Sidibé appelle ses collègues pour discuter du problème rencontré par leur service et des mesures à prendre. Après réflexion et analyse des éléments, ils décident d'investiguer la tendance et les facteurs associés du diabète de type 2 dans leur service de diabétologie de 2010 à 2019.

Questions

Pour aider le Dr Sidibé et ses collègues à résoudre ce cas d'étude auquel ils font face, il vous a demandé de :

1. Formuler la question de recherche.
2. Faire une revue de littérature pour leur question de recherche.
3. Filtrer les résultats trouvés en tenant compte de la période de 2010 – 2017, puis sélectionner cinq articles pertinents parmi la liste et envoyer les articles sélectionnés à votre email personnel à partir de PubMed en suite transféré ce mail à partir de votre email professionnel à l'email (ellearning@maferinyah.org).
4. Faire un résumé en 500 mots (dans Word) de votre revue de littérature, insérer les références pour chaque paragraphe en utilisant Mendeley et établir la bibliographie.

IMPORTANT: SEULEMENT LES FICHIERS WORD SONT PERMISES, DONC PRIERE DE SOUMETTRE QUE LE DOCUMENT WORD.

